


Análisis predial sobre el comportamiento histórico de las coberturas

Pantallazo 1 Visor Global Forest Watch




Pantallazo 2 Imagen Satelital Predio



Captura de pantalla 1 Resultados del análisis en Global Forest Watch

Análisis de pérdida de cobertura arbórea histórico:

Se observa que la pérdida de cobertura arbórea no ha sido constante a lo largo del tiempo, sino que se ha concentrado en periodos específicos. La mayor pérdida se registró alrededor del año 2007, con dos picos menores adicionales en 2009 y 2012. Desde 2012, no se ha registrado ninguna pérdida perceptible de cobertura arbórea en el Área de Interés hasta el final del periodo analizado en 2024, lo que indica una estabilidad en la cubierta forestal durante la última década.



En referencia a la **ganancia en cobertura arbórea** del año 2000 al 2020, Área de interés ganó 4 ha de cobertura arbórea, lo que equivale al 1.05% de su extensión total en ese período de tiempo.

En referencia a las coberturas que presenta la finca se encuentra lo siguiente:

En 2000, el 11% del Área de Interés tenía una cubierta arbórea con más del 30% de densidad de copas.

Para mayor detalle sobre el análisis realizado, consultar <https://gfw.global/3Hbk5li>